



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СОБАК И КОТОВ

Большинство владельцев домашних животных убеждены, что достаточно весной и осенью «пролечить» животных противоглистным препаратом, и можно забыть об этом мероприятии до следующего потепления. На самом деле профилактические приемы таких лекарств дважды в год необходимы, но применять их нужно и в других ситуациях

Текст: Наталья СОКОЛОВА, врач ветеринарной медицины, клиника «Ветмир», Киев

Наиболее распространенные гельминтозы домашних собак и кошек

Нематодозы (*Toxocara canis/cati*)

Животные, контактируя с предметами, загрязненными на улице, проглатывают яйца токсокар. Вы приносите яйца токсокар на обуви с улицы домой, здесь они становятся частью домашней пыли, попадают на шерсть животного и далее, при вылизывании, внутрь.

Заражение может произойти внутриутробно или через молоко матери, при этом яйца появляются в фекалиях щенков только через 3 недели после рождения. При сильной инвазии токсокарами щенки в возрасте от 20 суток до 2,5 месяцев могут погибнуть.

У молодых животных при умеренной и тяжелой степени заражения может наблюдаться диарея, рвота, вздутие живота, слабость. Иногда развивается частичная или полная закупорка кишечника большими переплетенными скоплениями червей.

Лечение токсокароза является достаточно сложным процессом, т.к. животное снова и снова заражается.

Для профилактики заболевания необходима плановая дегельминтизация всех собак. Для этого Всемирная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) рекомендует использовать комплексные препараты. Одним из препаратов, соответствующим этим требованиям, является «Энвайр» и «Энвайр для собак» корпорации «Артериум».

Корпорация «Артериум» – отечественная компания, которая производит препараты в соответствии с требованиями стандарта GMP (Good Manufacturing Practice – «Надлежащая производственная практика»), что обеспечивает высокое доверие к продукции со стороны ветеринарных врачей и владельцев животных. Немаловажно, что при своем высоком качестве «Энвайр» и «Энвайр для собак» доступны по цене.

Врачи нашей клиники имеют опыт работы в ветеринарии более 10-ти лет. Одной из схем лечения токсокароза в нашей клинике является применение

препарата «Энвайр для собак» три дня подряд в дозе, указанной в инструкции, с месячного возраста. Этот препарат содержит фебантел, который действует на токсокар при трехкратном применении. «Энвайр для собак» также может применяться для лечения токсокароза кошек трехкратно в дозировке, указанной в инструкции, с 1,5-месячного возраста. Эта схема отличается от наставления по применению препарата, но является более эффективной и в некоторых случаях необходимой.

Цестодозы *Dipylidium caninum* (огуречный цепень)

Заражение происходит при проглатывании блох и вшей. У больного животного при заражении могут наблюдаться рвота, диарея или копростаз (закупорка кишечника), апатия. Чаще всего дипилидиоз протекает бессимптомно.

Для избавления от дипилидиоза необходимо устранить блох у всех домашних животных и продезинфицировать места их обитания (за три дня до

применения антигельминтика). В противном случае уже через день после дегельминтизации может произойти повторное заражение.

При постановке диагноза дипилидиоз у питомца врачи нашей клиники рекомендуют назначать «Энвайр» или «Энвайр для собак». Эти препараты содержат празиквантел в дозе, необходимой для лечения дипилидиоза (5 мг/кг).

Схема профилактической дегельминтизации

В соответствии с рекомендациями WSAVA мы предлагаем следующую схему профилактической дегельминтизации домашних животных. Для этого в клинике используем «Энвайр» и «Энвайр для собак»:

Щенков дегельминтизируем в 4, 6, 8 недель, потом ежемесячно до 6–8 месяцев.

Если у животного отсутствуют клинические симптомы заражения паразитами, профилактическая дегельминтизация ему все равно необходима, ведь многие гельминтозы протекают бессимптомно.

Котят – каждые 3 недели, начиная с 6-ти недель, потом ежемесячно до 6–8 месяцев.

Кормящую суку дегельминтизируем одновременно со щенками (т.е. в возрасте щенков 4, 6, 8 недель).

Взрослых собак и кошек (старше 8–12 месяцев), гуляющих на улице и получающих в корм сырое мясо, субпродукты или рыбу, лучше всего дегельминтизировать 1 раз в 3 месяца, двукратно с интервалом в 14 дней.

Пастушьих и рабочих охотничьих собак целесообразно дегельминтизировать 1 раз в месяц.

Кошек домашнего содержания (негуляющих) при отсутствии в рационе сырой рыбы, сырого мяса, продуктов бойни и при отсутствии в доме собак или иных источников блох, допустимо дегельминтизировать 1 раз в 6 месяцев, но лучше – 1 раз в 3 месяца, двукратно с интервалом в 14 дней.

При наличии установленного диагноза, подтвержденного результатами анализов, схема использования антигельминтного препарата и режим приема подбираются индивидуально. Поэтому, если ваш ветеринарный врач дает рекомендации, расходящиеся с указанными в аннотации, поинтересуйтесь, в чем причина.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на нашем сайте www.zoodrug.ua

**Желаю здоровья вам
и вашим питомцам!**



Надійний захист від гельмінтів для собак та котів

ЕНВАЙР - знищує круглих та стьожкових гельмінтів на всіх стадіях розвитку паразиту

ЕНВАЙР - регулярно застосовувати 1 раз на квартал

ЕНВАЙР - впевненість у відсутності гельмінтів



За додатковою інформацією звертайтеся: менеджер з продажу ветеринарних препаратів Корпорації «Артеріум»
Олег Прохоренко тел. (044) 4907522, (050) 4197761

З турботою про здоров'я тварин

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація

До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм».

ARTERIUM
ВЕТЕРИНАРІЯ