



Herpevir®  
**ГЕРПЕВІР®**  
мазь ацикловіру 2,5 %

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування  
лікарського засобу**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України 15.08.2016 № 836  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/2466/02/01  
ЗМІНИ ВНЕСЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України 17.01.2017 № 33

**Склад:**

*діюча речовина:* aciclovir;

1 г мазі містить ацикловіру у перерахуванні на 100 % речовину 25 мг;

*допоміжні речовини:* пропіленгліколь, проксанол 268-Ф, поліетиленоксид 400, емульгатор № 1.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* однорідна мазь білого кольору зі слабким специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Протівірусні засоби. Код АТХ D06B B03.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакокінетика.*

Ацикловір – це протівірусний препарат, який має високу активність *in vitro* проти вірусу простого герпесу I та II типів. Токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна. Потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, ацикловір фосфорилується з утворенням активної сполуки – трифосфату ацикловіру. Перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази. Трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.

*Фармакокінетика.*

Рівень системної абсорбції ацикловіру після повторного місцевого застосування мазі Герпевір® мінімальний.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Інфекції губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу (*Herpes labialis*).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів мазі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Взаємодії не виявлено.

**Особливості застосування.**

Мазь слід застосовувати лише для лікування герпесу на губах та обличчі.

Не рекомендується наносити мазь на слизові оболонки ротової порожнини, очей та застосовувати його для лікування генітального герпесу.

Слід уникати випадкового потрапляння мазі в очі.

Особи, які страждають від особливо тяжких та повторюваних проявів *Herpes labialis*, потребують консультації лікаря. Осіб, хворих на герпес, потрібно застерегти від контактної передачі вірусу іншим людям, особливо при наявності відкритих уражень (наприклад мити руки до та після використання мазі). Не рекомендується застосовувати особам з імунodefіцитом. Такі особи потребують консультації лікаря стосовно лікування будь-якої інфекції.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Вагітним та жінкам, які годують груддю, препарат рекомендується застосовувати тільки у тих випадках, коли користь, на думку лікаря, перевищує ризик.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Дані відсутні.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат призначений лише для зовнішнього застосування.

**Дітям віком від 12 років та дорослим** мазь Герпесвір® слід наносити 5 разів на добу приблизно з 4-годинними інтервалами, за винятком нічного часу. Важливо розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще – під час продромального періоду або на стадії еритеми. Можна розпочати лікування і на пізніх стадіях – папули або пухиря.

Лікування має тривати щонайменше 4 дні. Якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів. Якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, хворому необхідно звернутися до лікаря. Слід вимити руки до та після використання мазі, та уникати зайвого тертя або торкання рушником уражених ділянок, щоб запобігти загоєнню або передачі інфекції.

**Діти.** Даних щодо безпеки застосування препарату дітям віком до 12 років недостатньо, тому рекомендується застосовувати препарат дітям віком від 12 років.

**Передозування.** При випадковому пероральному або місцевому застосуванні всього тюбика мазі несприятлива дія малоімовірна через мінімальний системний вплив. У випадку підозри на передозування необхідно звернутися за медичною допомогою.

### **Побічні реакції.**

У деяких пацієнтів при застосуванні мазі може з'явитися тимчасовий швидкоминучий гострий або пекучий біль. Приблизно у 5 % пацієнтів можливе незначне висушування та лущення шкіри. Також у невеликої частини пацієнтів можливі еритема (почервоніння) та свербіж. Дуже рідко повідомлялося про випадки контактної дерматиту після місцевого застосування препаратів ацикловіру, та частіше за все це пов'язано з компонентами мазової основи, а не з ацикловіром. Є поодинокі повідомлення про реакції негайної гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, унаслідок місцевого застосування ацикловіру.

**Термін придатності.** 5 років.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 5 г або 15 г у тубі, 1 туба у пачці.

### **Категорія відпуску.**

За рецептом по 15 г у тубі; без рецепта по 5 г у тубі.

### **Виробник.**

ПАТ «Київмедпрепарат».

### **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

**Дата останнього перегляду.** 17.01.2017.