

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
30.08.2018 №1572  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/9248/01/01

**ИНСТРУКЦІЯ  
по медичному применению лекарственного средства**

**КАСТОРОВОЕ МАСЛО  
(CASTOR OIL)**

**Состав:**

действующее вещество: касторовое масло;  
50 мл лекарственного препарата содержит: касторовое масло – 50 мл.

**Лекарственная форма.** Масло.

**Основные физико-химические свойства:** прозрачная, почти бесцветная или светло-желтая, вязкая, гигроскопическая жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа.** Слабительные лекарственные средства.  
Код ATХ A06A B05.

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика.**

При приеме внутрь гидролизуется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника и рефлекторно усиливает его перистальтику. Слабительный эффект наступает обычно через 5–6 часов. Препарат также вызывает рефлекторное сокращение миометрия.

**Фармакокинетика.**

Фармакокинетика не определялась.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

Запоры.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к препарату. Отравление жирорастворимыми веществами (фосфором, бензолом и др.). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит. Отравление жирорастворимыми противогельминтными средствами, экстрактом папоротника мужского. Острые воспалительные процессы в брюшной полости (аппендицит, перитонит). Маточные кровотечения. Кахексия. Пожилой возраст.

Повышенная чувствительность к растениям семейства Малочайных (*Euphorbiaceae*), недиагностированная боль в области живота, обструкция желчевыводящих протоков, тяжелая дегидратация.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**  
Не рекомендуется применять Касторовое масло одновременно с экстрактом папоротника мужского.

**Особенности применения.**

Касторовое масло является традиционным лекарственным средством растительного происхождения. Показания к применению лекарственного средства подтверждены

длительным опытом применения. Лекарственное средство следует применять только по показаниям. Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить Вашему здоровью.

*Применение в период беременности и кормления грудью.*

Применение препарата противопоказано беременным. В период кормления грудью препарат можно применять только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для ребенка.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Информация отсутствует.

**Способ применения и дозы.**

Применять внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет – 15–30 г на прием. Если препарат применять для очищения кишечника перед диагностическими процедурами, то целесообразно принять его за 6 часов до проведения процедуры.

Если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются какие-либо побочные реакции, пациент должен проконсультироваться с врачом.

**Дети.** Препарат применять детям старше 12 лет.

**Передозировка.**

Тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Лечение симптоматическое.

**Побочные реакции.**

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, нарушение водно-электролитного баланса. После опорожнения кишечника возможен запор. При длительном применении – нарушение пищеварения, энтероколит, развитие привыкания, атония кишечника. Возможны аллергические реакции.

**Срок годности.** 5 лет.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель / заявитель.** ПАО «Галичфарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

**Дата последнего пересмотра.**