



**ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України 15.12.2016 № 1345
Реєстраційне посвідчення
№ UA/15646/01/01
№ UA/15646/01/02

ЗМІНИ ВНЕСЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.05.2018 №908

Склад:

діюча речовина: macrogol;
1 пакет-саше містить поліетиленгліколю (макроголу) 4000 у
перерахуванні на 100 % речовину 4 г або 10 г.

Лікарська форма. Порошок для орального розчину.

Основні фізико-хімічні властивості: порошок білого або май-
же білого кольору.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Осмотичні
проносні засоби. Макрогол. Код АТХ A06A D15.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. За рахунок утворення водневих зв'язків
з молекулами води препарат утримує її в кишечнику. Таким
чином збільшується вміст рідини у порожнині кишечника, що
поліпшує процес випорожнення.

Фармакокінетика. Проносна дія препарату настає через
24–48 годин після прийому.

Препарат не всмоктується і не метаболізується. Виводиться з
організму у незміненому стані.

Клінічні характеристики.

Показання.

Симптоматичне лікування запорів.

Протипоказання.

Гіперчутливість до макроголу.

Запальні захворювання товстої кишки (неспецифічний вираз-
ковий коліт, хвороба Крона, токсичний мегаколон).

Кишкова непрохідність або підозра на кишкову непрохід-
ність.

Перфорація шлунково-кишкового тракту або її загроза.

Біль у животі невизначеного походження.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види
взаємодій.**

Можливе уповільнення абсорбції лікарських засобів, які
приймають одночасно з препаратом Легколакс. Тому реко-
мендується приймати препарат окремо від інших засобів, з
інтервалом не менше 2 годин.

Особливості застосування.

До початку лікування потрібно виключити органічну при-
роду запору. Лікування запору будь-яким лікарським за-
собом є лише допоміжною терапією за умови дотримання
здорового способу життя та культури харчування, а саме:
споживання більшої кількості рідини та клітковини, відпо-
відної фізичної активності та відновлення діяльності ки-
шечнику.

Максимальна тривалість застосування дітям – не більше 3
місяців.

Той факт, що симптоми не зникають навіть у результаті
застосування препарату та дотримання відповідної дієти,
може вказувати на інші патології, що потребують діагнос-
тики та лікування.

Були зафіксовані випадки аспірації при введенні значних
об'ємів поліетиленгліколю з електролітами через назого-
стральний зонд. Особливий ризик аспірації спостерігаєть-
ся у дітей з неврологічними порушеннями акту ковтання.

Слід з обережністю застосовувати пацієнтам, схильним
до порушення водно-електролітного балансу, а саме: па-
цієнтам літнього віку, пацієнтам з порушеннями функцій

LEGKOLAX
ЛЕГКОЛАКС

печінки або нирок; при одночасному прийомі сечогінних засобів, враховуючи можливість розвитку діареї. Також рекомендується контролювати електролітний баланс.

Препарат не містить цукор, тому його можна призначати хворим на цукровий діабет, а також особам, з раціону яких виключається галактоза.

Оскільки препарат містить макрогол, можливі симптоми підвищеної чутливості до діючої речовини (див. розділ «Побічні реакції»).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат можна призначати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не встановлено.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений для перорального застосування.

Лікування нормалізує моторику товстого кишечника за умови дотримання відповідної культури харчування (дієти).

Дорослим і дітям віком від 8 років зазвичай призначають по 10–20 г на добу.

Добова доза для дітей від 6 місяців до 1 року становить 4 г, від 1 року до 4 років – 8 г, від 4 до 8 років – 16 г.

Вміст пакета-саше попередньо розчиняють у склянці води, прозорого соку (наприклад, яблучного) або холодного чаю, дітям до 1 року – в 50 мл води.

Приймати Легколакс бажано вранці під час їди, за один прийом. Перший ефект від застосування препарату настає протягом 24–48 годин після прийому.

Щоденна доза визначається відповідно до клінічного ефекту і може становити від 4 г через день (для дітей) до 20 г на день.

Тривалість застосування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання, ефективності лікування. Тривалість лікування для дітей не повинна перевищувати 3 місяців, оскільки немає даних клінічних досліджень щодо застосування препарату понад цей термін.

Діти.

Препарат можна застосувати дітям віком від 6 місяців.

Передозування.

У зв'язку з відсутністю системної абсорбції передозування малоімовірне.

Передозування призводить до діареї, яка зникає, якщо тимчасово припинити застосування препарату або зменшити дозу. Через надмірну втрату рідини внаслідок діареї або блювання може бути потрібна корекція порушеного водно-електролітного балансу.

Побічні реакції.

В окремих випадках може виникнути здуття живота та/або біль у животі, нудота, блювання, гострі позиви до випорожнення та мимовільне випорожнення кишечника.

При прийомі дуже великої дози можливий розвиток діареї, яка припиняється через 1–2 доби після відміни препарату; після цього можна приймати препарат у нижчих дозах. У дітей діарея може викликати болісні відчуття в періанальній ділянці.

Можливе порушення водно-електролітного балансу (гіпонатріємія, гіпокаліємія) і/або зневоднення, особливо у пацієнтів літнього віку.

Дуже рідко можуть виникнути реакції гіперчутливості, включаючи шкірний свербіж, кропив'янку, висип, набряк обличчя, набряк Квінке, анафілактичний шок, бронхоспазм.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 4 г або 10 г в пакетах-саше, 4 або 10 або 20 пакетів-саше в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПАТ «Київмедпрепарат».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Дата останнього перегляду. 11.05.2018.