

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
12.06.2015 № 336
Регистрационное удостоверение
№ ДА/4557/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

ХЛОРОФИЛЛИПТ
(CHLOROPHYLLIPT)

Состав:

действующее вещество: 1 мл лекарственного препарата содержит хлорофиллипта экстракт густой (*extractum chlorophyllipti spissum*) (1:15,3) (экстрагент-этанол 96 % об/об) – 20 мг;
вспомогательное вещество: масло подсолнечное.

Лекарственная форма. Раствор масляный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная маслянистая жидкость темно-зеленого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства.
Код АТХ D08A X.

Фармакологические свойства.

Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактериоцидной) активностью по отношению к стафилококкам, а также антисептической и противовоспалительной активностью.

Клинические характеристики.

Показания.

Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми стафилококками: эрозии шейки матки, ожоги, трофические язвы.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Усиливает действие антисептических препаратов.

Особенности применения.

Перед началом применения необходимо посоветоваться с врачом.

После первого применения необходимо сделать паузу в 6-8 часов. Курсовое лечение препаратом возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на экстракт хлорофиллипта густой (вероятность отека губ, слизистой оболочки носа, зева и других аллергических реакций). Если появились любые из приведенных симптомов, прием препарата необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Способ применения и дозы. Перед применением препарат необходимо взболтать.

Препарат применять местно, смазывая поврежденные участки при помощи тампона. Длительность аппликаций и курс лечения определяет врач индивидуально.

При лечении эрозий шейки матки предварительно высушивают тампонами все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки; канал шейки матки смазывать Хлорофиллиптом. Смоченный в препарате тампон оставить на шейке матки на 15-20 минут. Манипуляции проводить 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить (после консультации с врачом).

Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует.

Передозировка.

Возможно усиление побочных реакций. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции.

Со стороны иммунной системы: при применении препарата возможны аллергические реакции включая отек слизистых оболочек, гиперемия в месте нанесения, зуд, сыпь.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 мл или 30 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

Тест структурної схожості

Присуджено

▽

№ 102-15